

## CELLULITIS/ERYSIPELAS

Cellulitis is een lokale infectie van de huid en subcutis t.g.v. een bacteriële infectie (meestal de verwekker *S. aureus*). De infectie verloopt met milde of geen ziekteverschijnselen.

Erysipelas is een ontsteking van de huid en subcutis, ook via de lymfebanen voortschrijdend. Meestal is de verwekker bèta-hemolytische streptokok en soms wordt het veroorzaakt door *S. aureus*.

Differentiatie tussen cellulitis en erysipelas is soms lastig te maken. Derhalve wordt behandeling erysipelas gelijkgetrokken aan behandeling cellulitis.

### NIET-MEDICAMENTEUS ADVIES:

Indien er sprake is van oedeem, indien mogelijk zwachtelen.

### MEDICAMENTEUS ADVIES:

- eerste keuze is flucloxacilline
- tweede keuze (bij penicilline overgevoeligheid) clindamycine

## PREPARATEN BIJ CELLULITIS/ ERYSIPELAS

Flucloxacilline	Tablet 500 mg	<b>D:</b> 500 mg 4 dd gedurende 10 tot 14 dagen <b>B:</b> Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria, purpura. <b>CI:</b> Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen.
Clindamycine	Capsule 300 mg	<b>D:</b> 600 mg 3 dd gedurende 10 dagen <b>B:</b> Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, tijdelijke stijging transaminasewaarden. <b>CI:</b>