

ONYCHOMYCOSE

Onychomycosen ('schimmelnagels') zijn doorgaans onschuldig en in de meeste gevallen is er geen medische noodzaak om de infecties te behandelen. Voor systemische therapie is een kweek essentieel. Systemische behandeling heeft vaak vervelende bijwerking. Daarnaast is er een reële kans op niet-aanslaan van de therapie of een recidief. Zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen is essentieel alvorens over te gaan tot behandeling.

MEDICAMENTEUZE THERAPIE:

Onychomycose van de vingernagels

Hierbij is er meestal sprake van een zuivere candida (gist) infectie en een behandeling met itraconazol wordt aangeraden

Onychomycose van de teennagels

Hierbij is meestal een dermatofyt (schimmel) de verwekker en kan worden behandeld met terbinafine.

PREPARATEN BIJ ONYCHOMYCOSE

Itraconazol	Capsule 100 mg Drank 10 mg/ml (Trisporal)	D: 1 dd 200 mg of pulstherapie: 2 dd 200 mg gedurende 7 dagen per 4 weken (1 puls), B: max. 3 maanden behandelen. Capsule mag niet geopend worden. Alternatief: drank CI: Lang QT-intervalsyndroom. Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen en hartfalen. Statines zijn gecontra-indiceerd en het kan de spiegels verhogen van digoxine en anticoagulantia.
Terbinafine	Tablet 250 mg	D: 1 dd 250 mg, bij vingernagels 6 weken behandelen en bij teennagels 3 maanden. Bij slechte nagelgroei langer behandelen. B: Max. 3 maanden behandelen. Tabletten mogen vermalen worden. Bij smaak- en gehoorverlies therapie onmiddellijk staken omdat continueren van de therapie tot irreversibele schade kan leiden. CI: Leverfunctiestoornissen, verminderde nierfunctie dosis reductie IA: terbinafine remt CYP2D6, remt het metabolisme van carbamazepine en TCA's