

SCABIES

Scabiës (schurft) is een besmettelijke, sterk jeukende huidafwijking die veroorzaakt wordt door een mijt, *Sarcoptes scabiei*. Typische plekken waar schurft kan zitten zijn in de lichaamsplooiën; tussen de vingers, polsen, oksels, billen en penis.

NIET MEDICAMENTEUZE MAATREGELEN:

Wanneer er een infectie wordt geconstateerd:

- Raadpleeg lokale scabies-protocollen over hoe te handelen. Voor meer info zie <http://www.huidinfo.nl/s/schurft/>

MEDICAMENTEUZE ADVIEZEN:

Medicamenteuze behandeling pas starten indien de infectie is bewezen. Contactpersonen met een hoog risico dienen eveneens behandeld te worden.

Stap 1:

- Permetrine crème
- Benzylbenzoaat smeersel

Stap 2: indien cutaan onvoldoende werkt

- Ivermectine

Let op: Bovenstaande middelen zijn niet in ziekenhuisapotheek aanwezig. Levertijd 1-2 werkdagen, kondig gepland gebruikt derhalve aan bij ziekenhuisapotheek. (Dienstdoende ziekenhuisapotheker bereikbaar via 0591-691020)

PREPARATEN BIJ SCABIES

Permetrine (Laxazol)	Hydrofiële Crème 50 mg/g	D: smeer 1 keer het hele lichaam in, van kaakrand tot tenen en laat 8-12 uur inwerken. Na 7 dagen eventueel herhalen B: 's avonds gebruiken Verergering van jeuk, irritatie van de huid. Contact met ogen, slijmvliezen en acuut ontstoken huid vermijden. CI:
Benzylbenzoaat	Smeersel 25%	D: Smeersel op het gehele lichaam grondig aanbrengen tot aan de kaakrand incl. alle plooiën. 24 uur laten inwerken. Hierna lichaam wassen met water en zeep. Na de initiële behandeling nog minimaal 2x herhalen met 24 uur tussenpoos. B: Verergering van jeuk, irritatie van de huid. Contact met ogen, slijmvliezen en acuut ontstoken huid vermijden.

		CI: -
Ivermectine (stromectol)	Tablet 3 mg	D: 200 ug/kg in 1 dosis. Na 2 weken herhalen als er nieuwe laesies ontstaan of bij positief parasitologisch onderzoek. B: CI: