

ACUTE OTITIS MEDIA

Otitis media acuta is een bij volwassenen meestal een spontaan genezende ziekte, in 90% van de gevallen zijn de ergste klachten na 3 dagen spontaan over. Een loopoor verdwijnt meestal binnen 2 weken.

MEDICAMENTEUZE THERAPIE:

- Bij erge pijn kan paracetamol gegeven worden.
- Bij toenemend ziek zijn, toenemende oorpijn, of geen verbetering na 3 dagen antibioticum voorschrijven.
- Eerste keus is amoxicilline, tweede keus is claritromycine of co-trimoxazol.
- Verwijs bij verdenking op mastoïditis of meningitis, bij uitblijven verbetering 48 uur na starten antibiotica, bij persisteren loopoor gedurende 2 weken na antibiotica, bij persisteren trommelvliesperforatie twee maanden na ontstaan loopoor en bij vaak terugkeren van de infectie (3 of meer episodes per jaar).

PREPARATEN BIJ ACUTE OTITIS MEDIA

Paracetamol	Tablet 500 mg Zetpil 500 mg, 1000 mg	D: 500 - 1000 mg per keer, meestal 1-1,5 g per dag, maximaal 4 g per dag. B: Tablet mag vermalen worden. CI: Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen.
Amoxicilline	Tablet disp. 500 mg	D: 500 mg 4 dd gedurende 7 dagen. B: Tablet kan in water uiteenvallen. CI: -
Claritromycine	Tablet 250 mg, 500 mg Suspensie 25 mg/ml, 50 mg/ml	D: 500 mg 2 dd gedurende 7 dagen. B: Tablet mag niet vermalen worden. Alternatief suspensie. CI: Voorzichtigheid bij hypokaliemie vanwege verhoogd risico op verlenging QT-interval.
Co-trimoxazol	Tablet 480 mg Suspensie 40 mg/8mg/ml	D: 960 mg 2 dd gedurende 7 dagen. B: Tablet mag niet vermalen worden. Alternatief: suspensie. CI: Lang-QT-interval syndroom. Porfyrie.