

## DEMENTIE

### MEDICAMENTEUZE THERAPIE:

- **Delirium bij dementie**

Het is belangrijk om eerst uit te sluiten of de onrust/agitatie bij dementie niet berust op een delirium.

Zie voor de behandeling van een delirium het hoofdstuk [Delirium](#)

- **Psychose bij dementie**

Voor de behandeling van een psychose wordt verwezen naar het hoofdstuk [Psychose](#)

- **Depressie bij dementie**

Bij een depressie is de eerste keus citalopram , of mirtazepine Zie ook hoofdstuk [Depressie stap 2](#).

Bij een psychotische depressie kan een antipsychoticum worden toegepast. Zie hoofdstuk [Psychose](#) .

- **Angst bij dementie**

Bij acute angst: oxazepam.

Op lange termijn: Zie hoofdstuk [Angststoornissen](#)

- **Dag/nachtritme, (in)slaapproblemen bij dementie**

Bij een gestoord dag/nachtritme kan pipamperon a.n. worden gegeven.

Bij slaapproblemen wordt temazepam a.n. gegeven.

Bij 's nachts wakker worden kan op dat moment midazolam worden gegeven.

- **Agressie bij dementie**

Eerste keus is haloperidol.

Tweede keus is pipamperon

- **Sexuele ontremming bij dementie**

Bij seksuele ontremming kan ranitidine worden gegeven.

- **Anti-Alzheimermiddelen**

Rivastigmine is geregistreerd voor lichte tot matig ernstige vormen van Alzheimer. Bij een gevorderde ziekte is de meerwaarde niet aangetoond. In klinisch onderzoek is de meerwaarde aangetoond bij Lewy body dementie. Als de patiënt aan de criteria voldoet en zelf wil gebruiken kan Exelon worden geprobeerd, mits een objectiveringsinstrument (GIP) wordt gebruikt. Na een half jaar dient evaluatie plaats te vinden. Heeft er achteruitgang plaatsgevonden ondanks gebruik van Exelon, dan dient gestopt te worden.

Memantine is geregistreerd voor matig ernstige tot ernstige vormen van Alzheimer.

Memantine kan worden overwogen bij gedragsstoornissen gelieerd aan dementie.

### PREPARATEN BIJ DEMENTIE

Citalopram	Tablet 20 mg	<b>D:</b> Start met 10 mg 's ochtends, verhoog per 10 dagen met 10 mg max 60 mg. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Lang QT-intervalsyndroom. Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, epilepsie, ulcus pepticum en diabetes mellitus
Haloperidol	Tablet 1 mg, 5 mg Drank 2 mg/ml	<b>D:</b> 1 mg 2 dd. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Ziekte van Parkinson. Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, benigne prostaathypertrofie, hartfalen en epilepsie
Memantine	Tablet 10 mg	<b>D:</b> Volgens opbouwschema. Start met 5 mg per dag gedurende een week. Verhoog met stappen van 5 mg per week tot 10 mg 2 dd.

		<b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> -
Midazolam	Tablet 15 mg	<b>D:</b> Bij 's nachts wakker worden 7,5 mg. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, slaapapneu, myasthenie en porfyrie
Mirtazepine	Tablet 15 mg, 30 mg	<b>D:</b> a.n. 30 mg, na 6 weken evt. a.n. 60 mg. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Voorzichtigheid is geboden bij prostaathypertrofie en epilepsie.
Oxazepam	Tablet 10 mg, 50 mg	<b>D:</b> 10 mg 3 dd. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, myasthenie, slaapapneu en porfyrie.
Pipamperon	Tablet 40 mg Druppels 40 mg/ml	<b>D:</b> a.n. 20 mg, evt a.n. 40 mg. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Ziekte van Parkinson. Voorzichtigheid is geboden bij epilepsie, prostaathypertrofie en hartfalen.
Ranitidine	Tablet 150 mg	<b>D:</b> 150 mg 1-2 dd. <b>B:</b> Tablet mag vermalen worden. <b>CI:</b> Voorzichtigheid geboden bij nierfunctiestoornissen en porfyrie.
Rivastigmine	Capsule 1,5 mg, 3 mg, 6 mg	<b>D:</b> Start met 1,5 mg 2 dd en verhoog vervolgens volgens schema. <b>B:</b> Capsules mogen geopend worden. Indien de behandeling langer dan enkele dagen is onderbroken, die herstarten van de therapie met de aanvangsdosering te worden begonnen om bijwerkingen te vermijden. <b>CI:</b> Voorzichtigheid is geboden bij astma en COPD.
Temazepam	Capsule 10 mg, 20 mg	<b>D:</b> a.n. 10-20 mg. <b>B:</b> Capsule kan rectaal gegeven worden, prik wel een gaatje mbv een naald. <b>CI:</b> Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis, slaapapneu, myasthenie en porfyrie.