

FRACTUREN

Overweeg verwijzing orthofoon Bij fracturen in het algemeen
Bij kinderen met onverklaarde pijn in
heup/knie/rug en/of mank lopen

ACHILLESPEESRUPTUUR

Kenmerken **Beleid**
Pijn, gestoorde functie, "delle" ter
plaatse pees Acuut verwijzen, operatief/conservatief
Handgreep van Thompson

ACUTE SLOTKLACHTEN KNIJE

Kenmerken **Beleid**
Inklemming agv OCD, corpus
liberum, (osteo) chondrale
fractuur, mensicus Acuut verwijzen, binnen 2 weken arthroscopie

ACUTE ZWELLING

Kenmerken **Beleid**
Dikke, pijnlijke knie. Evt gebruik
van bloedverduunners. Punctie gewricht, drukverband. Evt controle
INR

BACTERIËLE ARTRITIS, OSTEOOMYELITIS

Kenmerken **Beleid**
Pijn, zwelling, gestoorde functie,
koorts Acuut verwijzen: punctie gewricht, operatief
spoelen, antibiotica iv.
BSE, leuco's en CRP verhoogd

KNIETRAUMA, VOLLEDIGE INSTABILITEIT

Kenmerken **Beleid**
Bij evidente instabiliteit of twijfel
hierover Acuut insturen, loopkoker/spalk

EPIFYSIOLYSE CAPITIS FEMORIS 9 – 16 JAAR

Kenmerken **Commentaar**
Mank lopen en pijn lies/knie Direct verwijzen, onbelast houden.
Versterkte exorotatie (Verschuiving rotatietraject)

Beleid

X-bekken Heupfoto's tweezijdig en Lauenstein, bij
afwijking verwijzing orthopedisch
Omdat in minder dan 10% sprake is van een
acute slip wat dezelfde urgentie heeft als de
collumfractuur bij volwassenen.

MORBUS PERTHES 4 – 12 JAAR

Commentaar

Mank lopen en perioden van pijn
Beperkte abductie en rotaties

Beleid

X-bekken AP en Lauenstein, bij afwijkingen verwijzing
orthopedisch chirurg.

INFECTIE PROTHESE

- o Niet genezende wond Acuut verwijzen
- o Roodheid
- o Ziek, koorts
- o Terugval in revalidatie

PREVENTIE INFECTIE PROTHESE

Tandheelkundige ingrepen Eenmalig 1250 mg Augmentin 1 uur voor de
ingreep
Geïnfecteerde wonden huid Zo spoedig mogelijk adequate dosering
antibiotica

ALGEMEEN

Sportspreekuur Elke maandag van 8.00 – 10.00 uur